


## PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LESIONES POR PRESIÓN DE CATEGORÍA I Y II

(todos los puntos de apoyo en decúbito supino, prono, lateral y sentado)

### USO DE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS

- 1- Aplicar **MEPENTOL®** en todas las zonas de riesgo durante la estancia hospitalaria
- 2- **MEPENTOL®** protege la piel sometida a presión, fricción y cizalla
- 3- Seguir el protocolo de actuación para la prevención y el tratamiento de lesiones por presión



### MODO DE EMPLEO

#### Prevención y tratamiento categoría I

Aplicar **MEPENTOL®** sobre zonas de riesgo o lesión, extenderlo con la yema de los dedos hasta su total absorción

### MODO DE EMPLEO

#### Tratamiento categoría II

Aplicar **MEPENTOL®** directamente sobre lesión, o sobre gasa estéril, que se aplicará después sobre la úlcera. Cubrir con apósito apropiado

### CARACTERÍSTICAS

- Alta tolerancia
- No irritante
- Rápida absorción
- Compatible con apósitos

**MEPENTOL®**

Prevención y Tratamiento de Úlceras por Presión de categoría I y II

**ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS** (Únicos con Marca CE Clase IIb)

- **Aportan un grado óptimo de hidratación a la piel**, evitando la sequedad cutánea y restaurando el film hidrolipídico
- **Favorecen la renovación de las células epidérmicas**, mejorando la función barrera de la piel y facilitando la cicatrización
- **Mejoran la microcirculación sanguínea**, mejorando las lesiones cutáneas relacionadas con la isquemia

CON EL AVAL DE:



**ALFASIGMA** 