

		ACCIÓN	TRATAMIENTO LOCAL	
LIMPIEZA CON SUERO FISIOLÓGICO		LIMPIEZA		
TEJIDO - CONTROL DEL TEJIDO NO VIABLE		DESBRIDAMIENTO	PRODUCTOS	
T	ESFACELOS 	Aplicar apósito de gasa con DACC impregnado en gel.	<ul style="list-style-type: none"> CUTIMED® SORBACT® + CUTIMED® GEL CUTIMED® SORBACT® GEL CUTIMED® SORBION® SORBACT® en caso de elevado exudado 	FRECUENCIA CAMBIO APÓSITO 1 – 3 DÍAS
	PLACA NECRÓTICA 	Realizar pequeños cortes y aplicar apósito de gasa con DACC impregnado en gel.	<ul style="list-style-type: none"> CUTIMED® SORBACT® + CUTIMED® GEL CUTIMED® SORBACT® GEL 	1 – 3 DÍAS
DESBRIDAMIENTO MECÁNICO SIEMPRE QUE PROCEDA				
INFECCIÓN / INFLAMACIÓN		CONTROL DE LA INFLAMACIÓN Y/O INFECCIÓN: UPP CON SIGNOS EVIDENTES		
I	INFECCIÓN LOCAL 	Aplicar apósito con DACC sobre el lecho de la herida, sin límite de uso, precisa humedad para actuar. No utilizar en combinación con cualquier producto que contenga excipiente lipídico.	<ul style="list-style-type: none"> CUTIMED® SORBACT® + CUTIMED® GEL CUTIMED® SORBACT® GEL CUTIMED® SORBION® SORBACT® 	1 – 3 DÍAS
	INFECCIÓN SISTÉMICA	Derivación al médico responsable.		1 – 3 DÍAS
CONTROL DEL EXUDADO		CONTROL DEL EXUDADO: SEGÚN EL NIVEL DE EXUDADO		
M	ESCASO 	Aplicar Hidrogel + cobertura con apósito de espuma de poliuretano.	<ul style="list-style-type: none"> CUTIMED® GEL + CUTIMED® SILTEC B CUTIMED® SILTEC® PLUS 	2 – 7 DÍAS
	NIVEL ÓPTIMO 	Solo aplicar cobertura con apósito de espuma de poliuretano.	<ul style="list-style-type: none"> CUTIMED® SILTEC® B CUTIMED® SILTEC® PLUS 	2 – 7 DÍAS
	EXCESO 	Aplicar apósito superabsorbente más cobertura con apósito de espuma de poliuretano / Vendaje / Film de poliuretano.	<ul style="list-style-type: none"> CUTIMED® SORBION® SACHET S + CUTIMED® SILTEC B CUTIMED® SILTEC® PLUS 	2 – 7 DÍAS
ESTIMULACIÓN DE LOS BORDES EPITELIALES		ESTADO DE LA PIEL PERILESIONAL		
E	MACERADA POR LA HUMEDAD: APLICAR PELÍCULA BARRERA 	PIEL NORMAL PELÍCULA BARRERA: aplicar crema si precisa mayor hidratación o piel mas dañada.	<ul style="list-style-type: none"> CUTIMED® PROTECT FILM CUTIMED® PROTECT CREMA 	2 – 7 DÍAS
	MODULADOR DE PROTEASAS/COLAGENO ACELERA LA CICATRIZACIÓN 	HERIDAS CON TEJIDO DE GRANULACIÓN: se aplica sobre la herida con apósito absorbente si fuese necesario, no necesita retirarse se absorbe.	<ul style="list-style-type: none"> CUTIMED® EPIONA 	2 – 7 DÍAS
P	PREVENCIÓN UPP	REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN: apósito de espuma de poliuretano con capacidad de reducción de la presión.	<ul style="list-style-type: none"> CUTIMED® SILTEC® HEEL PLUS CUTIMED® SILTEC® PLUS CUTIMED® SILTEC® B 	7 – 14 DÍAS